



ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

	1-й месяц				2-й месяц			3-й месяц		
Продукт	7дн	7дн	7 дн	7 -10 дн	7 дн	7дн	до конца месяца			
Анкарцин	по индивидуальной схеме									
Мипро-Вит	1тх1р	1тх2р	1тх3р	1тх4р или 2тх2р			2тх3 р длительно			
Селен микро	10капельх1р									
Фитолецитин	2тх3р 3 месяца									
Диоскорейя плюс	1капсула х 3р 1 месяц				перерыв 10дн	1капсула х 3р 1 месяц			перерыв 10дн	1капсула х3р 1месяц
L -лизин	2тх2р 1 месяц с 11-го дня					перерыв 10дн	2тх2р 1 месяц			перерыв 10дн
Кардио-гиперстан	2тх3р 1 месяц							2тх3р 1 месяц		
Антигипертон или Тензином					1-2 х 3р 1 месяц					
Капиллярин	2тх3р 1 месяц									
Кардиочистин					2х3р 1месяц					
Дионорм								1капсула х3р 1 месяц		

Схемы приема Анкарцина

Схема №1. Применяется при отсутствии проблем со здоровьем и хронических заболеваний

Капли	1	3	7	12	18	25	35
Дни приема	3-4	3-4	5-6	5-6	5-7	5-7	5-7

*Капли (не зависимо от количества) нужно растворить в 0,5 л воды и пить в течении дня за несколько подходов.
Идеальное время приема раствора: либо за 30-40 минут до еды, либо 30-40 минут спустя после последнего приема пищи.*

Схема №2. Применяется при достаточно серьезных проблемах, с отяжелённым анамнезом

Капли	1	2	3	4	5	7	9	12	15	20	25	30	35
Дни приема	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	5-6	5-6	5-6	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7

Схема №3. При очень нестабильном состоянии здоровья, наличии перенесенных заболеваний, наличии хронических заболеваний. (чем более тяжелое состояние, тем с меньших доз и более постепенно необходимо начинать прием)

Капли	1/5	¼	1/3	½	1	2	3	4	5	7	9	12	15	20	25	30	35
Дни приема	5	4-8	3-6	6-8	6-8	6-8	6-9	6-8	6-8	7-8	7-9	7-9	7-9	8-10	8-10	8-10	8-10